

## PREDALČNO NAČELO

Jakob ima v dveh žepih vsega tri jabolka. Ob tem edinem podatku lahko samo ugibamo, koliko jabolok je v posameznem od obeh Jakobovih žepov. Nekaj trdnega pa vendarle lahko izjavimo. Zapišimo vse načine, kako se dajo porazdeliti tri jabolka na dva žepa. Dobimo preglednico:

število jabolok v prvem žepu	število jabolok v drugem žepu
3	0
2	1
1	2
0	3

V prvih dveh primerih sta v prvem žepu vsaj dve jabolki; v zadnjih dveh primerih velja isto za drugi žep. Zato drži: Jakob ima v enem od obeh žepov najmanj dve jabolki; ne vemo pa, ali gre za prvi ali drugi žep.

Iz obravnavanega zgleada povzamemo predalčno načelo: *Če so v dveh predalih (žepih) tri reči (jabolka), vsebuje eden od obeh predalov (žepov) vsaj dve reči (jabolki).*

Imejmo sedaj namesto dveh žepov  $n$  predalov in namesto treh jabolok  $n + 1$  reči. Splošno predalčno načelo pravi: *Če je v  $n$  predalih  $n + 1$  ali več reči, vsebuje vsaj en predal najmanj dve od teh reči.*

Načelo je jasno; ako bi bila v vsakem predalu le ena reč, bi bilo v  $n$  predalih le  $n$  ne pa  $n + 1$  ali več reči. Spet pa ne vemo, v katerem od  $n$  predalov sta vsaj dve reči.

Predalčno načelo se v matematiki večkrat uporablja. Tu bomo z njim izpeljali nekaj trditev.

- A. Naj bo naravno število  $a$  tuje praštevilu  $p$ ; obstaja potenca  $a^k$ ,  $1 \leq k \leq p - 1$ , ki pušča pri delitvi s  $p$  ostanek 1.

Če katerokoli celo število delimo s  $p$ , dobimo za ostanek eno od števil  $0, 1, 2, \dots, p - 1$ ; ostanek 0 se pojavi le, če je število  $a$  deljivo s  $p$ ; če dajeta števili pri delitvi s  $p$  isti ostanek, je njuna razlika deljiva s  $p$ . Ker je  $a$  tuj  $p$ , je vsaka od potenc

$$a, a^2, a^3, \dots, a^p \quad (1)$$

tuja  $p$  in ni deljiva s  $p$ . Zato se ostanki, ko delimo potence (1) s  $p$ , nahajajo med števili  $1, 2, \dots, p - 1$ . Števil (reči) v (1) je  $p$ , možnih ostankov

(predalov)  $p - 1$ . Po predalčnem načelu sta med potencami (1) potenci  $a^s$ ,  $a^t$  z eksponentoma

$$1 \leq s < t \leq p, \quad (2)$$

ki pri delitvi s  $p$  puščata enak ostanek. Njuna razlika

$$a^t - a^s = a^s (a^{t-s} - 1)$$

je zato deljiva s  $p$ . Ker je  $p$  tuj  $a^s$ , mora deliti  $a^{t-s} - 1$ . To pomeni, da pri celem številu  $m$  velja

$$a^{t-s} - 1 = mp.$$

Eksponent  $t - s = k$  je zaradi (2) naravno število in največ  $p - 1$ . Zadnja enakost se zapiše tudi

$$a^k = mp + 1$$

in trditev A je dognana.

*Zgled.*

Naj bo  $a = 8$ ,  $p = 13$ . S potenciranjem ugotovimo, da tri od potenc

$$8^j, \quad 1 \leq j \leq 13$$

dajejo pri delitvi s 13 ostanek 1. To so

$$\begin{aligned} 8^4 &= 4\,096 = 315 \cdot 13 + 1 \\ 8^8 &= 16\,776\,216 = 1\,290\,555 \cdot 13 + 1 \\ 8^{12} &= 68\,719\,476\,736 = 5\,286\,113\,595 \cdot 13 + 1 \end{aligned} \quad (3)$$

Pri  $a = 14$ ,  $p = 17$  od potenc

$$14^j, \quad 1 \leq j \leq 17$$

še le predzadnja daje pri delitvi s 17 ostanek 1; je namreč

$$14^{16} = 2\,197\,953\,337\,809\,371\,136 = 128\,114\,224\,080\,655 \cdot 17 + 1. \quad (4)$$

*Opomba.*

Trditev A se da takole dopolniti: Najmanjši naraven  $k$ , pri katerem daje potencia  $a^k$  pri delitvi s  $p$  ostanek 1, je delitelj števila  $p - 1$ , vsi drugi takšni  $k$  so večkratniki tega delitelja. Dokaz izpuščamo, ponazoritev dopolnitve je vidna v (3) in (4).

- B. Naravni števili  $a$ ,  $n$  naj bosta večji od 1 in  $a$  tuj številu 10. Obstaja potenca  $a^k$ , ki ima za zadnjo števk 1, pred njo pa  $n - 1$  števk enakih 0.

Ravnamo podobno kot pri A. Zaradi tujosti števil  $a$  in 10 se delitev potenc

$$a, a^2, a^3, \dots, a^{10^n} \quad (5)$$

z  $10^n$  nikoli ne izide; za ostanke so tako možnosti  $1, 2, 3, \dots, 10^n - 1$ . Potenc (5) je  $10^n$ , možnih ostankov  $10^n - 1$ ; po predalčnem načelu dajeta vsaj dve potenci iz (5) pri delitvi z  $10^n$  isti ostanek, npr. potenci  $a^s, a^t$ ,  $s < t$ . Razlika

$$a^t - a^s = a^s(a^{t-s} - 1)$$

je potem deljiva z  $10^n$ . Faktor  $a^s$  je tuj  $10^n$ , zato  $10^n$  deli faktor  $a^k - 1$ , kjer je  $k = t - s$  naravno število. Zato je  $a^k - 1 = v \cdot 10^n$  pri naravnem številu  $v$ . Od tod je

$$a^k = v \cdot 10^n + 1 = v0 \dots 01$$

in tu pred 1 nastopa  $n - 1$  ničel. Trditev B je dobljena.

*Zgled.*

Vzemimo  $a = 3$ ,  $n = 2$ . Z računanjem zaporednih potenc  $3, 3^2, 3^3, \dots$  najdemo, da je

$$3^{20} = 3\,486\,784\,401$$

najmanjša potenca števila 3, ki se končuje na 01. Na 001 se končuje šele  $3^{100}$ .

*Opomba.*

Najmanjši eksponent  $k$  za katerega drži trditev B, je delitelj števila  $4 \cdot 10^{n-1}$ . Dokaz spet izpuščamo, ponazoritev nudi zadnji zgled.

Naj bo  $a$  naravno število. Naravno število  $c$ , ki se začneja z nekajkrat zapored zapisanim  $a$  in se končuje z nekaj ničlami, zapišemo

$$c = a \dots a0 \dots 0. \quad (6)$$

Če je  $a = 37$ , je npr.  $c = 37\,373\,700$ ; tu se 37 ponovi trikrat, na koncu sta dve števki 0.

- C. Naj bosta  $a$ ,  $b$  naravni števili; obstaja število, ki ima obliko (6) in je deljivo z  $b$ .

Glejmo  $b + 1$  števil

$$a, aa, aaa, \dots, aaa \dots a, \quad (7)$$

ki nastanejo, ko zapišemo  $a$  enkrat, dvakrat,  $\dots$ ,  $b + 1$ -krat zapored. Ko števila iz seznama (7) delimo z  $b$ , so mogoči ostanki  $0, 1, 2, \dots, b - 1$ . Števil (7) je  $b + 1$ , za ostanek je  $b$  možnosti; po predalčnem načelu sta v (7) najmanj dve števili  $y, x$ , ki dajeta isti ostanek pri delitvi z  $b$ ; ker sta  $y, x$  različna, naj bo  $y > x$ . Razlika  $y - x$  je zato naravno število deljivo z  $b$ ; razlika ima tudi obliko (6), saj se  $y$  končuje z  $x$ . Trditev C je dobljena.

*Zgled.*

Poiščimo pri  $a = 17$  najmanjše število z zapisom (6), ki je deljivo z  $b = 84$ . Iskano število se končuje na  $n$  ničel in ga zato zapišemo

$$17 \dots 17 \cdot 10^n. \quad (8)$$

Ker je  $84 = 4 \cdot 21$ , mora biti število (8) deljivo s 4 in z 21. Prvi faktor v (8) je lih in torej tuj 4; zato mora 4 deliti drugi faktor  $10^n$ . Najmanjši eksponent  $n$ , pri katerem to velja, je 2. Ker je 21 tuj  $10^n$ , mora deliti prvi faktor v (8); s preizkusom preverimo, da 17 in 1717 nista deljiva z 21, pač pa 21 deli 171717. Iskano število je

$$17\,171\,700 = 84 \cdot 204\,425.$$

Če številu 17 171 700 pritaknemo nekaj ničel ali spredaj pripišemo nekajkrat skupino števk 171717, so dobljena števila še zmeraj deljiva s 84. Števil oblike (6), deljivih s 84, je tako neskončno mnogo.

Č. Če izmed zaporednih naravnih števil,

$$1, 2, 3, \dots, 2n - 1, 2n, \quad n \geq 2 \quad (9)$$

izberemo  $n + 1$  števil, sta med njimi vsaj dve zaporedni.

Iz zaporedja (9) izbrana števila

$$a_1 < a_2 < \dots < a_n < a_{n+1}$$

sestavljajo množico  $M$ ; seveda je

$$1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_n < a_{n+1} \leq 2n.$$



Števila množice  $M$  razdelimo na dva razreda. Število  $x$  iz  $M$  je v prvem razredu  $M_1$ , če je vsaj eno od števil  $x - 1$ ,  $x + 1$  v  $M$ , in v drugem razredu  $M_2$ , če nobeno od števil  $x - 1$ ,  $x + 1$  ni v  $M$ . Jasno je, da vsako število iz  $M$  pade ravno v enega od obeh razredov  $M_1$ ,  $M_2$ . Ker je  $n \geq 2$ , je  $n + 1 \geq 3$ ; tako so v dveh razredih vsaj tri števila. Zato po predalčnem načelu vsaj eden od razredov  $M_1$ ,  $M_2$  vsebuje vsaj dve števili zaporedja (9). Pokažimo, da je to razred  $M_1$ . Razred  $M_2$  bi lahko zajel največ vsa liha števila

$$1, 3, 5, \dots, 2n - 1$$

ali pa največ vsa soda števila

$$2, 4, 6, \dots, 2n.$$

Obakrat je to največ  $n$  števil in je potem v  $M_1$  vsaj eno število  $x$ . Če pa je  $x$  v  $M_1$ , je z njim v  $M_1$  vsaj eno od števil  $x - 1$ ,  $x + 1$ ; če je to  $x - 1$ , sta  $x - 1$ ,  $x$  zaporedni naravni števili; za  $x + 1$  sta  $x$ ,  $x + 1$  zaporedna. Trditev Č je dobljena.

*Opomba.*

Zaporedni naravni števili sta zmeraj tuji. Ugotovitev Č torej pove, da sta med  $n + 1$  števili, vzetimi iz zaporedja (9), vsaj dve tuji števili.

*Zgled.*

Pri  $n = 2$  premore množica (9) števila

$$1, 2, 3, 4.$$

Množico  $M$  sestavljajo tri izmed teh štirih števil; vse možnosti za  $M$  so tako

$$1, 2, 3$$

$$1, 2, 4$$

$$1, 3, 4$$

$$2, 3, 4$$

V drugem primeru je le en par zaporednih naravnih števil, namreč 1, 2; tudi v tretjem primeru je en sam tak par 3, 4; v prvem primeru sta para dva, namreč 1, 2 in 2, 3; prav tako sta v zadnjem primeru dva para 2, 3 in 3, 4. Ko  $n$  narašča, se število možnosti za  $M$  hitro večja. Pri  $n = 6$  vsebuje množica (9) števila

$$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12$$

in izmed njih je možno izbrati 7 števil na 792 različnih načinov. Toliko je sedaj možnosti za  $M$ ; neposredno preveriti trditev Č tu ni prav lahko.

Znameniti matematik Paul Erdős (1913–1996) je mladim nadebnim matematikom rad zastavljal nalogo, naj dokažejo trditev:

D. Če izmed števil

$$1, 2, 3, \dots, 2n \quad (10)$$

izberemo  $n + 1$  števil, sta med njimi vsaj dve takšni, da manjše deli večje.

Vsako izmed  $n + 1$  izbranih števil se da pisati v obliki

$$2^k z, \quad (11)$$

kjer je  $k$  nič ali naravno število,  $z$  pa liho naravno število. (Npr.  $240 = 2^4 \cdot 15$ ,  $35 = 2^0 \cdot 35$ .) Med števili v (10) je  $n$  lihih

$$1, 3, 5, \dots, 2n - 1.$$

Za  $z$  v izrazitvi (11) je tako največ  $n$  možnosti. Izbrani števili damo v isti razred, če imata v zapisu (11) enak  $z$ . Ker je izbranih števil  $n + 1$ , možnosti za  $z$  pa kvečjemu  $n$ , imata od izbranih števil vsaj dve enak  $z$  in padeta v isti razred. To sta npr. števili  $x, y$ ; ker sta različni, smemo vzeti  $x < y$ . Torej je

$$x = 2^s z, \quad y = 2^t z \quad \text{pri } 0 \leq s < t.$$

Ker je  $\frac{y}{x} = 2^{t-s}$ ,  $x$  deli  $y$ . Trditev D je dognana.

Zgled.

Za  $n = 3$  sestavljajo množico (10) števila

$$1, 2, 3, 4, 5, 6.$$

Izmed njih je mogoče izbrati štiri različna števila na 15 načinov. Med izbranimi četvericami so npr.

$$2, 3, 4, 5$$

$$3, 4, 5, 6$$

$$2, 3, 5, 6$$

V prvi četverici le 2 deli 4, v drugi le 3 deli 6; v teh dveh četvericah sta v vsaki le dve takšni števili, da manjše deli večje. V tretji četverici 2 deli 6 in 3 deli 6; tu imamo dva para števil, ko manjše deli večje.

- E. Množica  $M$ , ki jo sestavlja  $n + 1$  različnih naravnih števil, manjših od  $2n$ , vsebuje vsaj eno število, ki je vsota dveh (različnih) števil iz  $M$ .

V množici  $M$  je  $n + 1$  naravnih števil

$$a_1 < a_2 < \dots < a_n < a_{n+1}, \quad (12)$$

ki so pod  $2n$ ; zato je

$$1 \leq a_1, \quad a_{n+1} \leq 2n - 1. \quad (13)$$

Zaradi (12) so razlike

$$a_2 - a_1, a_3 - a_1, \dots, a_{n+1} - a_1 \quad (14)$$

različna naravna števila in naraščajo; po (13) je zadnja, največja diferenca pod  $2n$ . V množicah (12) in (14) je skupaj  $2n + 1$  naravnih števil, ki so vsa pod  $2n$ ; to pomeni, da so zanje možne le vrednosti  $1, 2, \dots, 2n - 1$ . Ker je števil  $2n + 1$ , razpoložljivih vrednosti zanje pa  $2n - 1$ , imata po predalčnem načelu vsaj dve števili, npr.  $u, v$ , isto vrednost  $u = v$ . V (12) so sama različna števila, prav tako v (14); od enakih števil  $u, v$  mora zato eno biti v množici (12), drugo v množici (14). Je npr.  $u = a_i, v = a_j - a_1$ ; zaradi  $u = v$  je  $a_j = a_i + a_1$  in števila  $a_1, a_i, a_j$  so iz  $M$ . Trditev E je dobljena.

*Zgled.*

Pri  $n = 4$  so pod 8 naravna števila  $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ ; izmed njih je mogoče 5 števil izbrati na 21 načinov; toliko je možnosti za  $M$ . Ena od možnosti za  $M$ , tj. (12), je

$$3 < 4 < 5 < 6 < 7.$$

Tu je  $3 + 4 = 7$  in nobeno drugo od števil  $4, 5, 6, 7$  iz  $M$  ni vsota dveh različnih števil iz  $M$ . Če se za  $M$  vzame števila

$$1 < 2 < 3 < 5 < 6,$$

je  $1 + 2 = 3, 1 + 5 = 6, 2 + 3 = 5$  in tri števila iz  $M$  so vsote dveh različnih števil iz  $M$ .

Včasih srečamo predalčno načelo v še bolj splošni obliki:

Če je  $kn + 1$  reči razporejenih v  $n$  predalov, vsebuje vsaj en predal najmanj  $k + 1$  teh reči.

Tudi to je jasno. Ko bi vsak od  $n$  predalov vseboval največ  $k$  reči, bi bilo v vseh predalih največ  $kn$  reči; ne gre, saj je reči  $kn + 1$ .

F. Na gredo, ki ima obliko kvadrata s stranico 1 m, je posejal vrtnar 301 seme. Na gredi se najde krog s polmerom 8 cm, v katerega so padla vsaj štiri semena. (Seme vzamemo kot točko.)

Kvadratno gredo razdelimo z vzporednicami stranicam na 100 enakih kvadratkov, stranica vsakega meri 1 dm. Ker je  $301 = 3 \cdot 100 + 1$ , je  $k = 3$ ,  $n = 100$ . Po predalčnem načelu obstaja vsaj en kvadratek ki vsebuje najmanj  $k + 1 = 3 + 1 = 4$  semena. V krogu, ki je temu kvadratu očrtan, ta semena še tem bolj gotovo ležijo. Premer kroga  $2r$  je enak diagonali kvadrata; torej je  $2r = \sqrt{2}$  dm in

$$r = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ dm} = 0,707 \dots \text{ dm} < 8 \text{ cm}.$$

Trditev F je dognana.

Kdaj pa kdaj naletimo tudi na tole obliko predalčnega načela:

Če je v  $n$  predalih manj kot  $n$  reči, je vsaj en predal brez teh reči.

G. V pravokotni gozdni parceli, dolgi 30 km in široki 20 km, se zadržuje 49 medvedov, njihov stalež se s časom ne spreminja. V vsakem trenutku je na parceli pravokotno območje površine  $12 \text{ km}^2$ , na katerem ni nobenega medveda.

Težišče vsakega medveda projiciramo pravokotno na parcelo in dobimo s tem na njej 49 točk. Parcela meri  $600 \text{ km}^2$ ; razdelimo jo z vzporednicami stranicam na 50 pravokotnih parcelic dolžine 6 km in širine 2 km; torej meri parcelica  $12 \text{ km}^2$ . Ker je parcelic 50, medvedov pa 49, vsaj na eni od parcelic ni nobenega medveda. (S tem pa še ne vemo, katera od parcelic je v izbranem trenutku "varna").